

2026

VACUNACIÓN/INMUNIZACIÓN POR GRUPOS DE RIESGO EN < 18 AÑOS



	Imunodeprimidos (excluidos VIH)		VIH		Enfermedad cardiovascular y respiratoria crónica. Diabetes	Enfermedad hepática crónica	Insuficiencia renal crónica y Síndrome nefrótico	Fitula LCR. Implante coclear	Asplenia, déficit complemento, tratamiento con inhibidores del complemento	Cáncer y hemopatías malignas	Trasplantados progenitores hematopoyéticos ⁽¹⁾	Trasplante órgano sólido	Prematuros
	CD4<15% O <200/jl	CD4≥15% O <200/jl	2 dosis ^(a)	1-2 dosis ^(a)	1 dosis ^(a)	1-2 dosis ^(a)	1-2 dosis ^(a)	1 dosis ^(a)	1-2 dosis ^(a)	1-2 dosis ^(a)	1-2 dosis ^(a)	1-2 dosis ^(a)	1-2 dosis ^(a)
Haemophilus influenzae b			2 dosis ^(a)						1 dosis ^(a)	1 dosis ^(a)	4 dosis		
Neumococo conjugada			1-2 dosis ^(a)	1-2 dosis ^(a)			1-2 dosis ^(a)		1-2 dosis ^(a)	1-2 dosis ^(a)	1-2 dosis ^(a)	1-2 dosis ^(a)	
Neumococo polisacárida 23v			2 dosis ^(a)	2 dosis ^(a)	1 dosis ^(a)		1 dosis ^(a)	1 dosis ^(a)	2 dosis ^(a)	2 dosis ^(a)	2 dosis ^(a)	2 dosis ^(a)	
Meningococo B									2 o 3 dosis ^(a)		2 o 3 dosis ^(a)		
Meningococo A, C, W, Y			2 dosis						2 dosis		2 dosis		
Sarampión-rubéola-parotiditis	X	X	X								X	X	
Variola	X	X	X								X	X	
Virus del Papiloma Humano			3 dosis								3 dosis	3 dosis	
Hepatitis A			2 dosis										
Gripe													
Virus respiratorio sincitial	1 dosis ^(a) (Ac monoclona)	1 dosis ^(a) (Ac monoclona)	1 dosis ^(a) (Ac monoclona)	1 dosis ^(a) (Ac monoclona)	1 dosis ^(a) (Ac monoclona)								1 dosis ^(a) (Ac monoclona)
COVID-19	1 dosis ^(a)	1 dosis ^(a)	1 dosis ^(a)	1 dosis ^(a)	1 dosis ^(a)								1 dosis ^(a)

(a) A partir de los 5 años, en no vacunados con anterioridad.
 (b) A partir de los 5 años, una dosis adicional.
 (c) No vacunados previamente: 1-5 años, 2 dosis, >de 5 años: 1 dosis. Pauta 3+1 a los 2,4,6 y 11 meses de edad.
 (d) Dos dosis de VNP23, la primera con un intervalo de al menos 8 semanas desde la finalización de la pauta con VNC y siempre que el niño haya cumplido los 2 años de edad, y la segunda dosis, con un intervalo de al menos 8 semanas desde la finalización de la pauta con VNC y siempre que el niño haya cumplido los 2 años de edad.
 (e) Una sola dosis de VNP23 con intervalo de al menos 8 semanas desde la finalización de la pauta con VNC y siempre que el niño haya cumplido los 2 años de edad.
 (f) Número de dosis en función de la edad.
 (g) 2 dosis si menor de 9 años, tiene alguna condición de riesgo y primera vez que se vacuna.
 (h) Prematuros de menos de 35 semanas antes de cumplir los 12 meses de edad, y población infantil con alto riesgo de enfermedad grave por VRS hasta 24 meses de edad, según acuerdo nacional. Consultar en https://www.sanidad.gob.es/sistemas/promocion/prevenccion/vacunacion/programas/DeVacunacion/riesgo/doc/tabla_16_y_17.pdf
 (i) Las recomendaciones de vacunación se definirán previamente al inicio de cada temporada.
 (1) Vacunación en TPIC: https://www.sanidad.gob.es/sistemas/promocion/prevenccion/vacunacion/programas/DeVacunacion/riesgo/doc/tabla_16_y_17.pdf

X Vacuna contraindicada.

Administración en personas susceptibles o no vacunadas con anterioridad.

